

Le Blaireau en Lorraine



Description
Vie sociale
Les terriers
Reproduction
Nourriture
Répartition
Dangers
Indices

Description...

Le Blaireau européen (*Meles meles*) est un mammifère appartenant à l'ordre des carnivores...



C'est le plus grand mustélide de France : 70 à 100 cm de long et environ 30 cm au garrot pour 10 à 12 Kg.

Le Blaireau en Lorraine



Sa tête est caractéristique : blanche rayée de deux bandes noires.

Le reste de son pelage, "poivre et sel", contraste avec la gorge, le ventre et les pattes, plus sombres, voire noirs.



Ses pattes avant sont adaptées pour creuser. Elles sont équipées de fortes griffes non rétractiles.

Son ouïe est fine et son odorat très développé. En revanche, sa vue est médiocre.

Vie sociale

Les blaireaux peuvent vivre seuls, en couple ou, comme en Lorraine, en petit groupe.

Alors qu'en Angleterre des clans peuvent compter plus de 35 individus, en France, et dans la majorité des pays européens, les groupes sont constitués en moyenne de 2 à 4 adultes, avec 1 à 3 jeunes.



Les individus d'un groupe partagent un domaine vital et un vaste terrier.

4

Le Blaireau en Lorraine

En Europe continentale, la hiérarchie entre individus d'un clan semble peu marquée. De même, le blaireau semble peu territorial et il accepte la visite d'individus de clans voisins.



Le rythme d'activité du blaireau est étroitement lié à celui du soleil : en début de nuit, les activités de creusement, apport de litière et nettoyage des galeries du terrier, ainsi que des activités de "toiletage", sont maximales. Puis les blaireaux partent à la recherche de leur nourriture.

5

Les terriers...

Le blaireau passe la moitié de sa vie dans des terriers caractéristiques.

Constitués généralement de plusieurs entrées (appelées gueules), ils sont souvent situés en forêt ou dans des bosquets, au niveau de pentes ou de reliefs.



Un vrai labyrinthe est construit sous terre, composé de nombreuses galeries et de "chambres" garnies de litière (herbe, feuilles, etc.)

Régulièrement entretenus et agrandis, les terriers, utilisés de génération en génération, peuvent compter plusieurs dizaines de gueules. Leur nombre est donc sans rapport avec le nombre de blaireaux qu'abrite le terrier.



Il n'est pas rare de voir cohabiter avec le blaireau d'autres espèces comme le Renard ou le Chat forestier.

Chaque clan dispose de plusieurs terriers sur son domaine vital.

Cependant, seul un, dit "principal", souvent le plus gros, est utilisé toute l'année et sert à la mise-bas.

Les autres, appelés "secondaires", de taille plus modeste, sont utilisés de manière temporaire.



Reproduction...

Le blaireau a une reproduction particulière.

Bien que les femelles soient plus réceptives à la fin de l'hiver et au début du printemps, les blaireaux **peuvent s'accoupler toute l'année**. Pourtant, les naissances ont toujours lieu vers février. Ceci s'explique par une **ovo-implantation différée** : après l'accouplement, l'ovule fécondé "flotte" dans l'utérus jusqu'en décembre-janvier. C'est seulement à cette date que les embryons s'implantent dans la muqueuse utérine et se développent.



6 à 7 semaines plus tard, 3 jeunes en moyenne naissent, aveugles et sourds, dans une chambre du terrier.

Le Blaireau en Lorraine

En mars-avril, à l'âge d'un mois et demi, les blaireautins commencent à visiter le terrier obscur avant de sortir pour la première fois à l'air libre à l'âge de 8 semaines.



Allaités pendant environ 12 semaines, les blaireautins complètent leur

alimentation avec de la nourriture régurgitée par la blairelle dès la 6^e semaine, puis par des aliments solides trouvés aux abords du terrier.

C'est à 4 mois que les blaireaux sont émanipés. Contrairement à la grande majorité des espèces, pour lesquelles les jeunes quittent les parents, les jeunes blaireaux resteront dans le dani et ce sont les individus les plus âgés qui le quitteraient.

Nourriture

Le blaireau a un régime alimentaire généraliste et varié, notamment en fonction de la saison et de la facilité d'accès aux ressources.



Les vers de terre représentent une large part de son alimentation mais il se nourrit également d'insectes, de mollusques, d'amphibiens, de micro-mammifères, de charognes, de fruits, de bulbes, de baies, de céréales...

Le Blaireau en Lorraine

Le blaireau peut s'alimenter dans les cultures, principalement lorsque les céréales sont en lait. Cependant, ces "dégâts" restent localisés et limités en comparaison de ceux des sangliers. Cela ne justifie en aucun cas une destruction systématique des blaireaux.



Il arrive également qu'il occasionne quelques trous dans les jardins et pelouses lorsqu'il déterre des "vers blancs". Vous pouvez protéger vos jardins avec une dôtûre ou des odeurs (répulsifs, parfum, cheveux, etc.) qui éloigneront les animaux.

Répartition, dangers...

L'aire mondiale de répartition du blaireau est vaste. Elle s'étend à travers l'Europe et l'Asie. En Lorraine, le blaireau est présent sur l'ensemble de la région.



À partir de 1968, les blaireaux ont beaucoup souffert du gazage des terriers destiné à lutter contre la rage vulpine (éradiquée en 1998). Depuis son interdiction en 1991, les effectifs tendent à se reconstituer.

Cependant, des menaces pèsent encore sur cette espèce dont le **renouveau des populations** est naturellement lent.



Protégé dans de nombreux pays (Angleterre, Belgique, Pays-bas...), le **blaireau est une espèce "gibier"** en France. Elle est chassable, soit par tir, soit par vénerie sous terre, aussi appelée déterrage.

Le déterrage consiste à acculer le blaireau dans son terrier par des chiens introduits dans les galeries, puis à creuser afin de le saisir avec des pinces. L'animal est ensuite tué ou plus rarement relâché.



Cette pratique peut se dérouler à partir de la mi-mai, alors que les jeunes blaireaux ne sont pas encore émancipés !

Le piégeage du blaireau est interdit. Il arrive cependant que cet animal soit piégé, volontairement ou non, notamment lorsque le piégeage d'autres espèces est mal pratiqué.



Le trafic routier est également une cause de mortalité importante.

En captivité, le blaireau a une espérance de vie de 15 à 20 ans. Toutefois, en milieu naturel, les blaireaux ne dépassent généralement pas l'âge de 4 ou 5 ans.

Indices

Le blaireau est un animal qui laisse de nombreux indices de sa présence...

Terriers

Caractéristiques ! De nombreuses entrées, des "gouttières" à l'entrée des gueules, des aires de "grattages/jeux" où le sol est tassé...



Litière

Composée d'herbe, de mousse, de feuilles, le blaireau tapisse les chambres de son terrier. Il la change régulièrement.



Traces de griffes

Aux alentours du terrier, les blaireaux griffent certains arbres.



Empreintes

Caractéristiques, elles ressemblent à celles d'un petit ours.



Poils

Sur le terrier ou dans les barbelés : de 5 à 11 cm tricolores (clair – foncé – clair).



Fèces

Elles sont laissées dans de petits trous appelés "pots" regroupés en "latrines".



Coulées

Ces "pistes" sont formées par le passage répété des blaireaux sur le même parcours.



Le Blaireau en Lorraine



Groupe d'Etude des Mammifères de Lorraine

Secrétariat du GEML
176 rue Jeanne d'Arc
54000 NANCY

www.geml.fr

contact@geml.fr



"Enquête blaireau"

Afin de mieux connaître le blaireau en Lorraine,
le GEML a lancé une étude sur cette espèce.

N'hésitez pas à nous transmettre vos données de terriers
et vos observations. Des fiches d'enquête sont disponibles
sur www.geml.fr ou sur simple demande au secrétariat.

Photos : F. Fève - A. Lambert - Y. Lebecel - Association
Meles - M. & V. Munier - F. Nowicki - P. Russo -
F. Schwab - J.-B. Schweyer

Conception / Réalisation : Y. Lebecel - Océris Création
Juin 2007

Imprimé sur papier recyclé

