

# Neutraliser un terrier : comment procéder



## Cohabitation possible

Lorsqu'il est possible de cohabiter avec l'animal, **privilégier cette solution présente l'avantage de stabiliser la situation**. Un blaireau ou une famille non dérangé n'a en effet pas tendance à se déplacer ou à agrandir son terrier outre mesure.

Afin de sécuriser durablement le site, il peut être utile d'enterrer des traverses de chemin de fer ou des poutrelles aux endroits problématiques, là où les engins agricoles passent et sont susceptibles de basculer.

## Cohabitation impossible

Dans le cas où une cohabitation n'est pas possible, **l'idée majeure à retenir est de faire fuir durablement tout individu du site**, de boucher entièrement l'ensemble des galeries, de guêter sur le long terme la venue d'un nouveau clan et d'agir pour dissuader ce dernier de s'installer à son tour.

Agir vite, dès qu'une nouvelle gueule apparaît, s'impose.

## Méthode à privilégier : usage de répulsifs olfactifs

Le répulsif olfactif est un produit à base de savon noir et de piments (sans danger pour les cultures) qui, pour un animal ayant un odorat 800 fois supérieur au nôtre, représente une véritable agression (un peu comme si l'on remplissait notre habitation avec du gaz lacrymogène). Il est utilisé pour faire fuir l'animal de son terrier, lorsqu'il est avéré que le terrier est occupé (ne pas utiliser le produit de manière préventive !)

### Comment utiliser le répulsif

- Planter un piquet dans l'entrée du terrier et y attacher une bande de tissu d'1,50 m environ, imbibée de produit répulsif ;
- Pousser la bande de tissu le plus profondément possible dans le terrier au moyen d'un bâton, de telle sorte à ce que la bande de tissu soit tendue à l'intérieur du terrier (l'odeur du répulsif ne doit pas rester simplement dans la gueule du terrier mais doit pénétrer jusque dans les chambres qu'utilise le blaireau) ;
- Vaporiser l'équivalent de 2 bouchons de produit autour de la gueule du terrier (à environ 2 m) ;
- Une fois par semaine, renouveler les opérations.

A chaque passage, il est important de contrôler l'activité du site. Pour ce faire, disposer des brindilles dans la gouttière et dans la coulée menant au terrier (une épaisseur suffisante pour couvrir complètement le sol). Si entre deux contrôles du

site, aucune brindille n'a été déplacée, l'animal n'est pas passé.

D'autres signes montrent la désertion du site : présence d'une toile d'araignée dans la gueule, amoncellement de terre à l'entrée,... (si le blaireau est présent il entretient son habitat, gardant la gueule « propre »).

Après une durée variant entre 3 et 5 semaines sans activité sur le site, une obturation complète du terrier peut être réalisée.



*La pose d'un tissu imbibé de produit répulsif, remplacé tous les 7 jours, incite une famille à quitter son terrier*



### L'obturation du terrier

Il est possible de boucher un terrier **lorsque la désertion du terrier et du site est avérée.**

Pour ce faire, la meilleure méthode revient à disposer de la terre à l'entrée des galeries, puis à la faire couler au fond du terrier au moyen d'un flux d'eau. L'objectif est de combler l'ensemble des galeries, sur toute leur profondeur, sous peine de voir l'animal réinvestir les lieux. Avoir une citerne d'eau à proximité, voire deux, permet la réalisation de cette opération.

Le rebouchage peut être terminé, en plaçant de grosses pierres aux endroits où étaient situées les gueules, puis en les recouvrant d'une couche de terre. Ainsi obturées, les galeries ne peuvent être rouvertes.

Le site peut toutefois rester potentiellement intéressant pour l'espèce (couvert végétal, pente, sol meuble et bien drainé, proximité d'une source de nourriture...) et implique donc qu'un nouvel animal puisse à court ou moyen terme installer un nouveau terrier à proximité.

Seule une vigilance régulière et la pose immédiate de répulsifs rendront petit à petit le site inhospitalier pour l'espèce et éloigneront durablement les animaux.

Où se procurer du répulsif olfactif ?

**CONTACTEZ-NOUS !**

## Les méthodes alternatives


### La pose de clapets anti-retour



Dans certaines situations urgentes, il est possible d'installer un clapet anti-retour, **en dehors des périodes critiques** (février-juin). A la nuit tombée, l'animal sortira de son terrier mais ne pourra pas y retourner. La pose de produit répulsif autour des gueules complète efficacement ce dispositif. Un suivi assidu du site est indispensable.


### L'installation de clôtures électrique

Il peut être envisagé de dissuader des blaireaux de fréquenter un site en installant une clôture électrique, qui se situera entre le terrier principal et le terrier secondaire (ce dernier étant susceptible d'être situé en zone viticole, et donc de gêner). Cette clôture devra être suffisamment longue et basse. L'intérêt est qu'elle peut également freiner le passage de sangliers, souvent amateurs de raisins.



Mesures idéales d'une clôture efficace contre l'intrusion de blaireaux

L'utilisation de ces techniques, pour qu'elles soient efficaces, suppose une parfaite connaissance des moeurs de l'animal. L'avis d'un expert s'impose, faute de provoquer des situations contraires aux résultats escomptés.



AGIR pour la  
**BIODIVERSITÉ**  
ALSACE



Ligue pour la Protection des Oiseaux - GEPMA

Service Médiation Faune Sauvage  
03 88 22 07 35 - alsace.mediation@lpo.fr